


# BRODITOP SENSITIVE BLOQUE

## CEBO RATICIDA EN BLOQUE

### A BASE DE BRODIFACOUM 25 PPM

Bloque raticida para el control de ratones y ratas a base de Brodifacoum, activo con una sola ingestión. La muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. El producto contiene una mezcla perfectamente equilibrada de componentes de origen alimentario atractivos para los roedores y la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada humedad. Presenta un agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos, y múltiples bordes para facilitar su roedura. BRODITOP SENSITIVE BLOQUE 25 incorpora una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoato) para prevenir la ingestión accidental por animales no diana.



## Composición

Brodifacoum 0,0025%

## Plagas

Ratas y ratones

## Modo de empleo y dosis

BRODITOP SENSITIVE BLOQUE 25 se puede utilizar en interior y alrededor de edificios del entorno doméstico. Dosis y frecuencia de aplicación:

- Para el control de ratones – interior: 20-40 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 – 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.
- Para el control de ratas – interior y alrededor de edificaciones: 100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. Los portacebos deben revisarse a los 5 - 7 días después del comienzo de la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)

Recargar el portacebos cuando sea necesario. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas. Para uso alrededor de edificaciones: Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

### Instrucciones

Lea y siga la información proporcionada del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo. Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación. Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control. Aplicar medidas de control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. Los portacebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores. Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen producto rodenticida y que no deben ser movidos o abiertos. Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un otro rodenticida anticoagulante. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa. Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento.

### Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Tanto los roedores muertos como los cebos y los portacebos deben retirarse y eliminarse de conformidad con la legislación vigente. Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deben depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas.

### Autorización

R.D.G.S.P. N°: ES/BB(NA)-2018-14-00551 (USO POR EL PUBLICO EN GENERAL)

### Presentación

Estuche de 300g

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)