

# FICHA TÉCNICA

## MUSKIL® PASTA



R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2018-14-00135 (Uso por Personal Profesional Especializado)

### Cebo rodenticida en pasta fresca a base de Difenacoum y Bromadiolona

#### DESCRIPCIÓN

MUSKIL PASTA es un cebo en pasta rodenticida listo para su uso, en bolsitas de 15 g, basado en la combinación de dos ingredientes activos anticoagulantes de segunda generación, Bromadiolona y Difenacoum, equilibrado para dar al producto una acción efectiva para el control de ratas y ratones, en todas las etapas de desarrollo (Patente europea de Zapi Spa nº 2090164B1). Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores ocurre sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros de la colonia.

MUSKIL PASTA combina una mezcla bien equilibrada de componentes de origen alimentario, como la harina de leche, azúcar y grasas enriquecidas con cereales, particularmente apetecibles para las especies de roedores mencionadas anteriormente. Gracias a la alta palatabilidad, el cebo en pasta es extremadamente versátil, y su uso está indicado en áreas donde hay una fuerte competencia de alimentos, como es el caso de las industrias de alimentos, almacenes, hoteles, restaurantes, bares, etc. MUSKIL PASTA incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para ayudar a prevenir el consumo humano.

Producto solo para el uso de personal profesional especializado.

#### COMPOSICIÓN

Bromadiolona 0,0025%, Difenacoum 0,0025%, Benzoato de Denatonio 0,001%

#### FORMULACIÓN

Pasta fresca en bolsitas de 15 g

#### MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

Los cebos rodenticidas que contienen anticoagulantes activos (AVK) están destinados para un uso no permanente y con vista de gestión integrada de infestaciones. En el caso de que la infestación no sea completamente erradicada en el plazo de 35 días previstos en la regulación actual, el profesional especializado tendrá que considerar una reutilización del cebo rodenticida, en todos los lugares con un alto potencial de reinvasión, si otros métodos de control han demostrado ser insuficientes.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

MUSKIL PASTA se puede usar para el control de ratas y ratones en el interior y alrededor de oficinas, comunidades de vecinos, hospitales, restaurantes, parking, locales comerciales, almacenes, en medios de transporte, áreas abiertas y vertederos. Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de los roedores a la Bromadiolona y al Difenacoum antes de comenzar el tratamiento.

Para un apropiado control de la infestación de los roedores, es aconsejable realizar las siguientes fases:

### 1. Inspección del área

Antes de colocar el cebo, llevar a cabo una inspección del lugar para establecer el tipo (es decir, especies de roedores), el nivel y el grado de infestación. Anotar los posibles puntos de acceso de los roedores, madrigueras, escondites y eliminar todas las fuentes de agua y alimentos. La reducción de la disponibilidad de alimentos alternativos al inicio del tratamiento puede animar a los roedores a alimentarse de los cebos. Para reducir al mínimo el uso de cebos raticidas, en particular para el control de roedores en áreas o zonas sensibles, el uso de cebos no tóxicos debe ser el método más adecuado.

### 2. Tratamiento

El producto, aplicado por personal profesional especializado, se localizará en portacebos correctamente etiquetados, en el interior y alrededor de edificaciones e instalaciones fijas o móviles (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la edificación/instalación), en medios de transporte, en áreas abiertas y vertederos. Si el producto va a utilizarse en zonas públicas, se deben incorporar las siguientes precauciones de seguridad: las zonas tratadas deben estar señalizadas durante el periodo de tratamiento y junto a los cebos debe figurar un aviso que explique el riesgo de envenenamiento primario o secundario provocado por el anticoagulante, y en el cual también se deberán indicar las primeras medidas que deben tomarse en caso de envenenamiento.

- **Para infestaciones de ratas**

Alta infestación: hasta 100 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m

Baja infestación: hasta 100 g de cebo por punto de cebo, cada 10 m

- **Para infestaciones de ratones**

Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 2 m

Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m

### 3. Monitorización

Se deben realizar inspecciones periódicas de los portacebos colocados (se recomienda cada 3 o 4 días), y reemplazar o rellenar los que hayan sido consumidos por los roedores, dañados por el agua contaminados por la suciedad.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



**PESTNET ESPAÑA S.L.,**

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)

#### 4. Fin del tratamiento

El periodo de tratamiento finaliza cuando los cebos dejan de ser consumidos. Después de la campaña de control se debe comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos.

### PRESENTACIÓN

Cubo de 10 kg



La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



**PESTNET ESPAÑA S.L.,**

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

[www.pestnet-europe.es](http://www.pestnet-europe.es)