

TATHRIN

INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA INSECTOS RASTREROS

Insecticida concentrado bicomponente de doble acción: rápido efecto de choque y prolongada residualidad frente a los insectos rastreros de entornos ganaderos. Posee una acción sistémica y de contacto y una larga actividad de protección frente a posibles re-infestaciones que persiste hasta al menos 4 semanas después del tratamiento. El producto utiliza una formulación de última tecnología a base de disolventes especiales y coadyuvantes clasificados favorablemente para la protección de quien usa el producto y los asistentes a las áreas tratadas. Es fácil de diluir en agua y la emulsión permanece estable durante un largo tiempo. Es inodoro, no forma espuma y no mancha las superficies tratadas (es aconsejable, sin embargo, llevar a cabo pruebas de compatibilidad previas, en particular, en superficies y objetos delicados con el fin de verificar que no forma manchas o halos). El producto está indicado para el tratamiento, en interiores o exteriores de establos, granjas, graneros, depósitos de estiércol, refugios para animales, medios de transporte, alcantarillado, etc.



Composición

Cipermetrina 5%, Imidacloprid 2%

Plagas

- Insectos rastreros: piojos, pulgas, garrapatas, cucarachas, hormigas
- Ácaros rojos (*Dermanissus gallinae*)
- Escarabajos de la cama (*Alphitobius diaperinus*)

Modo de empleo y dosis

Aplicación del producto diluido en agua o en otro solvente adecuado en función del equipo utilizado, mediante pulverización, nebulización, ULV o termonebulización. Tratar las áreas en ausencia de animales.

- Aplicación por pulverización (la solución así obtenida se pulveriza sobre las superficies a tratar a razón de 1 litro por 20 m²):
 - Insectos rastreros: 200 ml del producto diluido en 10l de agua
 - Ácaro del pollo y escarabajo de la cama: 300 ml del producto diluido en 10l de agua

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es

- Aplicación mediante equipos ULV (ultra bajo volumen): a la dosis de 5% (500 ml en 10 litros de agua). Usar 800 ml de la solución así preparada para tratar 2.500 m³ o por cada 1000 m² de superficie de suelo)
- Aplicación mediante equipos de termonebulización: en interiores, diluir el producto en glicol al 4% (0,5 a 1litro de solución así preparada sirve para tratar de 1800 a 2100 m³); alcantarillado: 30-40 ml de producto diluido en glicol sirven para tratar 1000 m³.

La dosis de uso se puede aumentar en un 50% en presencia de infestaciones fuertes o cuando se traten superficies porosas. En presencia de superficies muy porosas se recomienda llevar a cabo una primera aplicación sólo con agua antes de aplicar el producto para sellar /cerrar los poros.

Plazo de seguridad

12 horas

Registro

R.O.P.Z. N°: 10117-P (USO GANADERO)

Presentación

Envase de 250 ml

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es